

大腸癌 SIRB療法(4回目以降)Ver.3.3

| | Day1 | Day21 |
|------|---|-------|
| 抗がん剤 | <p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■ヘパシマブ(100、400) … 7.5mg/kg (?)分で投与 … 30分 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 ! テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テカトロン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 15分 10時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋 ■イリノテカン(40、100) … 150mg/m² (?)分で投与 … 90分 11時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 12時30分 投与 点滴 … 1</p> | |
| 投薬 | <p>■---【投薬】</p> <p>■ティーエスワン … 下記参照 1日2回 朝・夕 食後 14日分 注射当日の【夕食後】より開始 ○2週投与1週休薬(SIRB)</p> | |
| 検査 | ※臨床試験項目を手動入力 | |

○出典:臨床第Ⅲ相試験(TRICOLORE)実施計画書

★TS-1を休薬・飲み忘れした場合でも、day1-15の朝食後までの内服とし、それ以降ずらしての内服は行わない。

★BVを中止する場合はS1+CPT-11のみ投与する。逆にBV単独投与は不可。

| | CPT-11 | TS-1 | | |
|-------|----------------------|-------------------------------|---|------------------------------|
| | | 体表面積 1.25m ² 未満 | 体表面積 1.25m ² ~1.5m ² 未満 | 体表面積 1.5m ² 以上 |
| 初回基準量 | 150mg/m ² | 40mg/回 (80mg/日) | 50mg/回 (100mg/日) | 60mg/回 (120mg/日) |
| 1段階減量 | 125mg/m ² | ※ (60mg/日) | 40mg/回 (80mg/日) | 50mg/回 (100mg/日) |
| 2段階減量 | 100mg/m ² | 25mg/回 (50mg/日) | ※ (60mg/日) | 40mg/回 (80mg/日) |

※TS-1が60mg/日の場合は、朝40mg、夕20mgに分割して投与する。