

大腸癌 ベハシズマブ+mCAPIRI療法(4回目以降)Ver.1.2

	Day1	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10時 投与 (?)分で投与 … 15分</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■ベハシズマブ(100、400) … 7.5mg/kg 10時15分 投与 (30)分で投与</p> <p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 !デキササート注6.6mg(デカロン8mg)瓶 … 1瓶 !デキササート注1.65mg(デカロン2mg) … 2管 (15)分で投与 10時45分 投与</p> <p>生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋 ■イリリテカン(40、100) … 200mg/m² (90)分で投与 11時 投与</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (5)分で投与 フラッシュ用 12時30分 投与</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>■カベシタピン(E法) … 800mg/m² 1日2回 朝・夕 食後 注射当日の【夕食後】より開始。 ○2週投与1週休薬(BV/mCAPIRI) 14日</p>	
検査	<p>■---【検査】</p> <p>血算+血液像+好中球数(機械値) … 1 化学療法 血糖(随時) … 1回 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総ビリルビン … 1回 コリンエステラーゼ … 1回 γ-GTP … 1回 総蛋白 … 1回 ALB … 1 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 UA … 1回 Na,K,Cl … 1 Ca … 1回 CRP … 1回 尿一般定性 … 1回</p>	

出典：Lancet Oncol 2018；19：660-71

★二次治療以降で使用

★UGT1A1遺伝子多型がホモ型、*6/*28のダブルヘテロ型ではIRIの投与量は150mg/m²とする

体表面積 (m ²)	1回用量 (1日2回)		
	初回投与量	減量段階①	減量段階②
1.26未満	900mg (3錠)	600mg (2錠)	600mg (2錠)
1.26以上 ~ 1.31未満		900mg (3錠)	
1.31以上 ~ 1.69未満	1,200mg (4錠)		
1.69以上 ~ 1.76未満			
1.76以上 ~ 1.88未満	1,500mg (5錠)	1,200mg (4錠)	
1.88以上 ~ 2.07未満	1,800mg (6錠)		
2.07以上 ~ 2.26未満		1,500mg (5錠)	900mg (3錠)
2.26以上			