

# 大腸癌 mCAPIRI療法 Ver.1.2

	Day1	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋                      ! デキサート注6.6mg(デカドロン8mg)瓶 … 1瓶                      ! デキサート注1.65mg(デカドロン2mg) … 2管                      (15)分で投与                      10時15分 投与</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋                      ■イリノテカン(40、100) … 200mg/m<sup>2</sup>                      (90)分で投与                      10時30分 投与</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶                      (5)分で投与                      フラッシュ用                      12時 投与</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>■カペンタピン(E法) … 800mg/m<sup>2</sup>                      1日2回 朝・夕 食後                      注射当日の【夕食後】より開始。                      ○2週投与1週休薬(mCAPIRI)                      14日</p>	
検査	<p>■---【検査】</p> <p>血算+血液像+好中球数(機械値) … 1                      化学療法                      血糖(随時) … 1回                      AST(GOT) … 1回                      ALT(GPT) … 1回                      ALP … 1回                      LDH … 1回                      総ビリルビン … 1回                      コリンエステラーゼ … 1回                      γ-GTP … 1回                      総蛋白 … 1回                      ALB … 1                      BUN … 1回                      クレアチニン … 1回                      UA … 1回                      Na,K,Cl … 1                      Ca … 1回                      CRP … 1回                      尿一般定性 … 1回</p>	

出典：Lancet Oncol 2018；19：660-71

★二次治療以降で使用

★UGT1A1遺伝子多型がホモ型、\*6/\*28のダブルヘテロ型ではIRIの投与量は150mg/m<sup>2</sup>とする

体表面積 (m <sup>2</sup> )	1回用量 (1日2回)		
	初回投与量	減量段階①	減量段階②
1.26未満	900mg (3錠)	600mg (2錠)	600mg (2錠)
1.26以上 ~ 1.31未満		900mg (3錠)	
1.31以上 ~ 1.69未満	1,200mg (4錠)		
1.69以上 ~ 1.76未満	1,500mg (5錠)	1,200mg (4錠)	
1.76以上 ~ 1.88未満			
1.88以上 ~ 2.07未満		1,800mg (6錠)	1,500mg (5錠)
2.07以上 ~ 2.26未満	900mg (3錠)		
2.26以上			