

# 大腸癌 ヘクティビックス+CPT-11 Ver.3.2

	Day1	Day14
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 20mL(管) … 1管 10mL、フラッシュ用 9時30分 投与 中心静脈注射 … 1</p> <p>パロセトン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 ！デキサト注6.6mg(デカロン8mg)瓶 … 1瓶 ！デキサト注1.65mg(デカロン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 15分 9時30分 投与 中心静脈注射 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 9時45分 投与 中心静脈注射 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■ベクティビックス(100) … 6mg/kg(60-900) (?)時間で投与 … 1時間 【全量100mLに調製】 ○フィルター使用確認 10時 投与 中心静脈注射 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 ○Pmab投与後1時間経過観察を説明 11時 投与 中心静脈注射 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋 ■イリノテカン(40、100) … 150mg/m<sup>2</sup>(120-300) (?)分以上かけて … 90分 11時15分 投与 中心静脈注射 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 5分 12時45分 投与 側管注 … 1</p>	

## 出典

- ①Seymour MT et al.: ASCO Annual Meeting 2011, Abst#3523.
- ②Chibaudel B et al.: ASCO Annual Meeting 2011, Abst#3573.