

胃癌 CapeOX(Cape+L-OHP 130mg m²) Ver.2.1

	Day1	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注235mg 10mL … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テカトロン2mg) … 1管 (30)分で投与 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 250mL(袋) … 1袋 ■オキサリプラチン(50、100) … 130mg/m² ! テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 0.5瓶 (2)時間で投与 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 5分 フラッシュ用 12時30分 投与 点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>■カペシタビン(C法) … 2000mg/m² 1日2回 朝・夕 食後 注射当日の【夕食後】より開始。 14日</p> <p>! テカトロン錠【4mg】 … 1錠 1日1回 朝食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 2日</p>	
検査	<p>■---【検査】</p> <p>血算+血液像 … 1回 化学療法 血糖(随時) … 1回 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総ビリルビン … 1回 コリンエステラーゼ … 1回 γ-GTP … 1回 総蛋白 … 1回 ALB … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 UA … 1回 Na,K,Cl … 1 Ca … 1回 CRP … 1回</p>	

出典: Gastric Cancer 2016; doi: 10.1007/s10120-016-0606-4.(承認時評価資料)

★術後補助療法は8コース。

★制吐療法はがん研究会有明病院レジメンを参照。