

# 胃癌(HER2陽性)トラスツズマブ(6mg/kg) + Cape(カペシタビン)療法 Ver.1.1

	Day1	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 ライン確保用 1日1回(外来注射) 点滴 … 1</p> <p>■トラスツズマブ … 6mg/kg (?)分で投与 … 90分 1日1回(外来注射) 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 1日1回(外来注射) 点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】 ■カペシタビン(C法) … 以下の通り 1日2回 朝・夕 食後 注射当日の【夕食後】より開始。 ○2週投与1週休薬(HER/Cape) 14日</p>	

出典:Lancet 376: 687-697, 2010

体表面積(m <sup>2</sup> )	1回用量(1日2回)		
	初回投与量	減量段階①	減量段階②
1.36未満	1,200mg(4錠)	900mg(3錠)	600mg(2錠)
1.36以上 ~ 1.41未満	1,500mg(5錠)		
1.41以上 ~ 1.51未満		1,200mg(4錠)	900mg(3錠)
1.51以上 ~ 1.66未満	1,800mg(6錠)		
1.66以上 ~ 1.81未満		1,500mg(5錠)	
1.81以上 ~ 1.96未満	2,100mg(7錠)		
1.96以上 ~ 2.11未満			