

胃癌 ニボルマブ+SOX(S1+L-OHP 130mg/m<sup>2</sup>)Ver.2.1

	Day1	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 ○フライング用 10時 投与</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■オプジーボ(360mg固定量) … 360mg (30)分で投与 ○フィルター使用確認! 10時15分 投与</p> <p>パロセトロン点滴静注ハック0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注235mg … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テカトロン2mg) … 1管 (30)分で投与 10時45分 投与</p> <p>ブドウ糖注 5% 250mL(袋) … 1袋 ■オキサリプラチン(50、100) … 130mg/m<sup>2</sup> ! テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 0.5瓶 (2)時間で投与 11時15分 投与 ○オプジーボ投与後30分以上あけて投与開始</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 13時15分 投与</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>■ティーエスワン(OD) … 下記参照 1日2回 朝・夕 食後 注射当日の【夕食後】より開始 ○2週投与1週休薬(SOX) 14日</p> <p>! テカトロン錠【4mg】 … 1錠 1日1回 朝食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 2日</p>	
検査	<p>■---【検査】</p> <p>血算+血液像+好中球数(機械値) … 1 化学療法 血糖(随時) … 1回 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総ビリルビン … 1回 コリンエステラーゼ … 1回 γ-GTP … 1回 総蛋白 … 1回 ALB … 1 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 UA … 1回 Na,K,Cl … 1 Ca … 1回 CRP … 1回</p>	

出典：Annals of Oncology 30:250-258,2019

	オキサリプラチン (L-OHP)	TS-1		
		体表面積 1.25m <sup>2</sup> 未満	体表面積 1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 未満	体表面積 1.5m <sup>2</sup> 以上
初回基準量	130mg/m <sup>2</sup>	40mg/回 (80mg/日)	50mg/回 (100mg/日)	60mg/回 (120mg/日)
1段階減量	100mg/m <sup>2</sup>	※ (60mg/日)	40mg/回 (80mg/日)	50mg/回 (100mg/日)
2段階減量	75mg/m <sup>2</sup>	25mg/回 (50mg/日)	※ (60mg/日)	40mg/回 (80mg/日)

※TS-1が60mg/日の場合は、朝40mg、夕20mgに分割して投与する。

★G-SOXとは減量時の投与量が異なることに注意する。