

胃癌 ゾルベツキシマブ(400mg/m²)+mFOLFOX6(2回目以降) Ver.1.1

	Day1	Day14
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 20mL(管) … 1管 10mL ホットフラッシュ用 9時30分 投与 静脈内注射 … 1</p> <p>生理食塩液 250mL「フソー」 … 1袋 9時30分 投与 メイント用 点滴 … 1</p> <p>アゼリオ静注液1000mgバッグ100mL … 0.5袋 カスター注射液20mg 2mL … 1管 ホウサン注 5mg1mL … 2管 (15)分で投与 9時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>ハロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注235mg 10mL … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テカトン2mg) … 2管 (30)分で投与 9時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 フラッシュ用 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 250mL「フソー」 … 1袋 ■ビロイ(100) … 400mg/m² 注射用水 100mL … 1瓶 10時15分 投与 ○フィルター使用確認 ○患者さんの状態を確認し、2時間以上かけて6時間以内で投与する ★ビロイ100mg1瓶を5mLの注射用水で溶解する</p> <p>ブドウ糖注 5% 250mL(袋) … 1袋 ■オキサリプラチン(50、100) … 85mg/m² ○レボホリナートと同時投与開始 (2)時間で投与 16時15分 投与 精密持続点滴 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 ■レボホリナート … 200mg/m² (2)時間で投与 16時15分 投与 側管注 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU(1000) … 400mg/m² 18時15分 投与 静脈内注射 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (5)分で投与 ホース後のフラッシュ 18時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU(1000) … 2400mg/m² スピード:2.2mL/h 18時15分 投与 【全量100mLに調製する】インフューザーポンプを使用 精密持続点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>! テカトロン錠【4mg】 … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 3日</p>	
検査	<p>■---【検査】</p> <p>血算+血液像+好中球数(機械値) … 1 化学療法 血糖(随時) … 1回 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総ビリルビン … 1回 コリンエステラーゼ … 1回 γ-GTP … 1回 総蛋白 … 1回 ALB … 1 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 UA … 1回 Na,K,Cl … 1 Ca … 1回 CRP … 1回</p>	