## 胃癌 ソブルヘンプキシマフ (600mg/m²)+CapeOX(2回目以降) Ver.1.1

| <u> </u> | ヾ゙ツキシマブ(600mg/m̃)+CapeOX(2回目以降)<br>  <sub>Day1</sub>  | Day21 |
|----------|---|-------|
|          | Dayı  | ,     |
| 抗がん剤     | ■──[注射] 生理食塩液 250mL「7ソー」… 1袋 9時30分 投与 メインルート用 点滴・・1 7セリオ静注液1000mg/*ック*100mL・・・0.5袋 カ*スター注射液20mg 2mL・・・1管 ホ*ララシン注 5mgImL・・・2管 (15)分で投与 9時30分 投与 点滴・・1 ハ*ロ/セトロー点滴静注ハ*ッグ*0.75mg/50mL・・・1袋 アロリス点滴静注235mg 10mL・・・1瓶 ! デ*キサート注1.65mg(デカト*ロン2mg)・・・2管 (30)分で投与 9時45分 投与 点滴・・1 生理食塩液 50mL(瓶)・・・1瓶 1つ時15分 投与 点滴・・・1 生理食塩液 50mL「7ソー」・・・1袋 ■ピロイ(100)・・・600mg/㎡ 注射用水 100mL・・・1瓶 10時15分 投与 ○フィルター使用確認 ○患者さんの状態を確認し、2時間以上かけて6時間以内で投与する ★ピロイ100mg1瓶を5mLの注射用水で溶解する アドウ糖注 5% 250mL(袋)・・・1袋 ■オキサリプラチン(50、100)・・・130mg/㎡ (2)時間で投与 16時15分 投与 精密持続点滴・・・1 生理食塩液 50mL(瓶)・・・1瓶 生理食塩液 50mL(瓶)・・・1 1袋 ■オキサリプラチン(50、100)・・・130mg/㎡ (2)時間で投与 16時15分 投与 精密持続点滴・・・1 | Day21 |
| 投薬       | ■【投薬】 ■カペシタビン(C法) ··· 2000mg/m <sup>®</sup> 1日2回 朝・夕 食後 注射当日の【夕食後】より開始。 14日 ! デカドロン錠【4mg】 ··· 2錠 1日2回 朝・昼 食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 3日  |       |
| 検査       | ■【検査】 血算+血液像+好中球数(機械値) ··· 1 化学療法 血糖(随時) ··· 1回 AST(GOT) ··· 1回 ALT(GPT) ··· 1回 ALP ··· 1回 LDH ··· 1回 対以エステラーゼ ··· 1回 対リエステラーゼ ··· 1回 アーGTP ··· 1回 総蛋白 ··· 1回 ALB ··· 1 BUN ··· 1回 UA ··· 1回 UA ··· 1回 UA ··· 1回 Na,K,Cl ··· 1 Ca ··· 1回 CRP ··· 1回   |       |

出典: Nature Medicine 2023;29:2133-2141