

# 膵癌 mFOLFIRINOX Ver.2.2

	Day1	Day14
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 20mL(管) … 1管 10ml、フラッシュ用 10時 投与 静脈内注射 … 1</p> <p>ハロセトン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注235mg 10mL … 1瓶 ！テキサート注6.6mg(テカロン8mg)瓶 … 1瓶 ！テキサート注1.65mg(テカロン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 30分 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 250mL(袋) … 1袋 ■オキサリプラチン(50、100) … 85mg/m<sup>2</sup>(50-) (?)時間で投与 … 2時間 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■イリノテカン(40、100) … 150mg/m<sup>2</sup>(100-) レボホリナートと同時投与開始 (?)時間で投与 … 1.5時間 12時30分 投与 精密持続点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 500mL … 1袋 ■レボホリナート … 200mg/m<sup>2</sup> (?)時間で投与 … 2時間 12時30分 投与 精密持続点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (5)分で投与 イリノテカン後フラッシュ 14時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU(1000) … 2400mg/m<sup>2</sup>(1200-) 14時30分 投与 (?)mL/時間 … 2.2mL 【全量100mlに調製する】ニフロシアーフューサーポンプを使用 精密持続点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>！テカロン錠【4mg】 … 2錠 1日2回 朝・夕食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 3日</p>	

出典: Cancer Chemotherapy and Pharmacology (2018)81:1017-1023

☆FOLFIRINOXに準じて補助療法はレジメン作成しています。

★開始前にUGT1A1遺伝子多型検査の実施が推奨されています。

★制吐療法は制吐薬適正使用ガイドラインを参考にHECへ修正

★CPT-11希釈液の生食250mLは臨床試験時の例を参照(適正使用情報: 日本膵臓学会)