

膵癌 GEM+S1〔術前補助〕 Ver.1.1

	Day1	Day8	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! デキサト注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶 ■ゲムシタピン(200、1g) … 1000mg/m<sup>2</sup> (?)分で投与 … 30分 10時30分 投与 【全量100mLに調製する】 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 11時 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! デキサト注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶 ■ゲムシタピン(200、1g) … 1000mg/m<sup>2</sup> (?)分で投与 … 30分 10時30分 投与 【全量100mLに調製する】 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 11時 投与 点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>■ティーエスワン … 80mg(1.25m<sup>2</sup>未満)、 100mg(1.25-1.5m<sup>2</sup>未満)、 120mg(1.5m<sup>2</sup>以上)</p> <p>1日2回 朝・夕 食後 注射当日の【夕食後】より開始 ○2週投与1週休薬(GEM+S1) 7日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>■ティーエスワン … 80mg(1.25m<sup>2</sup>未満)、 100mg(1.25-1.5m<sup>2</sup>未満)、 120mg(1.5m<sup>2</sup>以上)</p> <p>1日2回 朝・夕 食後 注射当日の【夕食後】より開始 ○2週投与1週休薬(GEM+S1) 7日</p>	
検査	<p>■---【検査】</p> <p>血算+血液像 … 1回 化学療法 血糖(随時) … 1回 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総ビリルビン … 1回 コリンエステラーゼ … 1回 γ-GTP … 1回 総蛋白 … 1回 ALB … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 UA … 1回 Na,K,Cl … 1 Ca … 1回 CRP … 1回</p>	<p>■---【検査】</p> <p>血算+血液像 … 1回 化学療法 血糖(随時) … 1回 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総ビリルビン … 1回 コリンエステラーゼ … 1回 γ-GTP … 1回 総蛋白 … 1回 ALB … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 UA … 1回 Na,K,Cl … 1 Ca … 1回 CRP … 1回</p>	

出典: J Clin Oncol 2019;37:189

★術前に2コース行う