

胆道癌 デュルバルマブ+ゲムシタピン+シスプラチン(30kg<体重) Ver.1.1

	Day1	Day8	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 ○フラッシュ用 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■イミフィンジ(120、500) … 1500mg (1)時間で投与 ○フィルター使用確認! 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 ○フラッシュ用 11時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液20mEq/20mL(コンクライトMg) … 0.5管 (?)分で投与 … 90分 11時30分 投与 側管注 … 1</p> <p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 !テキサート注6.6mg(テカロン8mg)瓶 … 1瓶 !テキサート注1.65mg(テカロン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 30分 11時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋 ■シスプラチン(10、50) … 25mg/m<sup>2</sup> (?)時間で投与 … 1時間 ○全量250mLで調製 12時 投与 点滴 … 1</p> <p>ソリタ-T3号 500mL … 1瓶 (?)分で投与 … 90分 ○シスプラチン終了確認後メイン交換 13時 投与 側管注 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶 ■ゲムシタピン(200、1g) … 1000mg/m<sup>2</sup> (?)分で投与 … 30分 13時 投与 【全量100mLに調製する】 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 ○フラッシュ用 13時30分 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液20mEq/20mL(コンクライトMg) … 0.5管 (?)分で投与 … 90分 9時30分 投与 側管注 … 1</p> <p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 !テキサート注6.6mg(テカロン8mg)瓶 … 1瓶 !テキサート注1.65mg(テカロン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 30分 9時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋 ■シスプラチン(10、50) … 25mg/m<sup>2</sup> (?)時間で投与 … 1時間 ○全量250mLで調製 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>ソリタ-T3号 500mL … 1瓶 (?)分で投与 … 90分 ○シスプラチン終了確認後メイン交換 11時 投与 側管注 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶 ■ゲムシタピン(200、1g) … 1000mg/m<sup>2</sup> (?)分で投与 … 30分 11時 投与 【全量100mLに調製する】 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 ○フラッシュ用 11時30分 投与 点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>!テカロン錠 4mg … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 【注射翌日より内服】 2日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>!テカロン錠 4mg … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 【注射翌日より内服】 2日</p>	

出典:N Engl J Med Evid.,1(8),1-11.2022

★臨床試験では最大8サイクルまで