

乳癌 FEC100 Ver.3.2

	Day1	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 ○プライミング用 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 500mL … 1袋 (?)時間で投与 … 3時間 10時 投与 側管注 … 1</p> <p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注235mg 10mL … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テカトロン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 30分 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 ○アロカリスフラッシュ用 10時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 ■エピルビシン … 100mg/m² ○全量100mLに調製する ○全開で投与 11時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■エンドキサン … 500mg/m² (?)分で投与 … 30分 ○エピルビシン終了後すぐに開始OK 11時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU … 500mg/m² (?)分で投与 … 30分 11時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 12時15分 投与 点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>! テカトロン錠 4mg … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 【注射翌日より内服】3日</p>	

出典: 乳癌診療ガイドライン 日本乳癌学会編 2007版