

## 再発乳癌(サートライン以降) エリブリン Ver.1.2

	Day1	Day8	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶                      ! テキサート注6.6mg(テ`カト`ロン8mg)瓶 … 1瓶                      (? )分で投与 … 30分                      10時 投与                      点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶                      ■エリブリン(1) … 1.4mg/m<sup>2</sup>(0.7-2.8)                      ○2~5分で投与。                      ☆生食25mL抜いて調製!                      10時30分 投与                      点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶                      (? )分で投与 … 15分                      ○エリブリン終了後すぐフラッシュ開始。                      10時30分 投与                      点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶                      ! テキサート注6.6mg(テ`カト`ロン8mg)瓶 … 1瓶                      (? )分で投与 … 30分                      10時 投与                      点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶                      ■エリブリン(1) … 1.4mg/m<sup>2</sup>(0.7-2.8)                      ○2~5分で投与。                      ☆生食25mL抜いて調製!                      10時30分 投与                      点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶                      (? )分で投与 … 15分                      ○エリブリン終了後すぐフラッシュ開始。                      10時30分 投与                      点滴 … 1</p>	

出典:ハラヴェン静注1mg 適正使用ガイド