

外科 乳癌:dose-densePTX Ver.1.1

	Day1	Day4	Day14
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ガスター注射液20mg 2mL … 1管 !デキサト注6.6mg(デカドロン8mg)瓶 … 3瓶 (?)分で投与 … 15分 9時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>前投与:レスタミン錠10mg … 5錠 9時45分 投与 化学療法前投与(内服) … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 ○レスタミン内服確認 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 ■バクリタキセル … 175mg/m² (?)時間で投与 … 3時間 ○フィルター使用確認 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 13時30分 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】</p> <p>ベグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg 0.36mL … 1筒 9時 投与 ○ケモ終了後24hr以降72時間以内に投与 皮下注 … 1</p>	
検査	<p>■---【検査】</p> <p>血算+血液像+好中球数(機械値) … 1 化学療法 血糖(随時) … 1回 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総ビリルビン … 1回 コリンエステラーゼ … 1回 γ-GTP … 1回 総蛋白 … 1回 ALB … 1 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 UA … 1回 Na,K,Cl … 1 Ca … 1回 CRP … 1回</p>		

出典:J Clin Oncol 2003;21(8):1431-9 Lancet 2015;385:1863-72

抗がん剤投与24時間以内にベグフィルグラスチムを投与した場合、骨髄の幹細胞が刺激されて増殖しているところに抗がん剤のダメージを受けて重篤な骨髄抑制を発現する可能性がある。
 抗がん剤投与終了後72時間を超えてのベグフィルグラスチムの投与は、PEG-GCSF未投与と比較して発熱発症割合や抗生剤投与期間に差は認められなかったという報告がある。